

CANTHYPORUS KENYENSIS N. SP., DEL MONTE KENYA

(Coleoptera Dytiscidae)

Durante un'escursione di tre giorni sul Monte Kenya (Kenya, Africa Orientale), nel settembre 1976, effettuammo ricerche di Idrocantaridi da quota 2.900, dintorni di Met Station, a quota 4.400, Teleki Tarn; nei rari ambienti di acqua dolce riscontrati la fauna entomologica acquatica è risultata estremamente povera, limitata a due specie.

Aulonogyrus conspicuus OCHS. Rinvenuto (in 12 es.) nel torrente Northern Naro Moru da q. 3.100 (nei pressi di Met Station) a quota 3.250; nel tratto esaminato la portata era piuttosto notevole e la corrente mediamente rapida con frequenti piccole cascate; l'acqua fredda, limpida, di colore ambrato, la vegetazione acquatica costituita da scarsi muschi. Specie nota finora solo del Monte Kenya. Det. F. Pederzani.

***Canthyporus kenyensis* n. sp.**

Località tipica - Sorgente a m 3.100 circa, dieci metri dalla riva destra del torrente Northern Naro Moru, poco a monte di Met Station, sul Monte Kenya (Kenya, Africa Orientale). L'acqua, filtrando dal terreno in quantità assai limitata, scorreva in lieve declivio ristagnando tra alti cespugli di graminacee e grossi massi, in pozzette a fondo melmoso spesso invase da alghe filamentose verdi (¹).

Holotypus (♂) e *Allotypus* (♀) in collezioni Bilardo e Sanfilippo: 45 *Paratypi* in collezioni: Museo Civico Storia Naturale Milano, Museo Civico Storia Naturale Genova, Bilardo, Sanfilippo, Pederzani, Franciscolo.

Descrizione - Lungh. mm 2,7 - 2,9; largh. mm 1,3; nero-rossiccio, depresso, stretto, subparallelo. Capo grande, nero; margine anteriore, tra gli occhi, testaceo; due ampie fossette frontali poco profonde, punti radi piccoli, poco impressi su fondo nettamente microreticolato con reticolo assai piccolo a maglie poligonali. Primi quattro articoli delle antenne testacei, gli altri a base testacea e rimbruniti all'apice. Pronoto nero nella parte centrale, testaceo ai lati con sfumature nella parte anteriore e, meno evidenti, anche posteriormente; strettamente ribordato, con lati debolmente arcuati in avanti. Punteggiatura fine e sparsa, eccetto una stretta fascia anteriore di punti più impressi, una fossetta centrale ed alcune, meno evidenti, posteriormente; fondo microreticolato. Angolo pronoto-elitrale appena accennato, ma netto. Elitre nero-rossicce, glabre, microreticolate con due striscie di punti impressi, radi, ben visibili, e pochi altri punti sparsi. Zampe bruno testacee. Parte inferiore nera con epipleure rossiccie.

Maschio: tarsi anteriori e mediani dilatati; fallo di forma caratteristica: lateralmente presenta una grossa apofisi rivolta verso la base; la parte terminale, arrotondata, è invece ripiegata in alto (figg. 1A e 1B). Parameri simmetrici, larghi, ar-

¹) In alta montagna ambienti di questo tipo sono abbastanza frequenti; l'esigua quantità di acqua che si deposita in piccolissime pozze, spesso occultate dalla vegetazione, può indurre a non effettuare alcuna ricerca; invece tali ambienti possono qualche volta ospitare specie di indubbio interesse e ritenute assai rare: citiamo quale esempio l'*Hydroporus regularis* SHARP che su montagne della Corsica si rinviene appunto in ambiente analogo a quello descritto.




Fig. 1A, 1B: pene di *C. kenyensis* n. sp., in visione dorsale e laterale.

Fig. 2A, 2B: pene di *C. alpestris*, in visione dorsale e laterale.

rotondati. Femmina simile al maschio, dal quale si distingue per i tarsi anteriori e medi non dilatati.

Abbiamo confrontato la nuova specie con la ♀ tipo di *C. subparallelus* GUIGNOT del Museo di Tervuren e col paratipo ♂ di *C. alpestris* GUIGNOT del Museo di Parigi, riscontrando le seguenti differenze:

- l'angolo pronoto-elitrare è piccolo ma netto in *C. kenyensis*, mentre è assente nelle altre due specie, in cui gli angoli posteriori del pronoto sono retti;
- la base del pronoto è profondamente biimpressionata in *C. kenyensis*, mentre questo carattere è assente nelle altre due specie;
- la linea elitrare discale di punti è ben distinta, diritta e regolare in *C. kenyensis* ed in *C. alpestris*, mentre è irregolare e poco riconoscibile in *C. subparallelus*;
- la taglia è un po' superiore: 2,7 - 2,9 mm in *C. kenyensis*; 2,7 mm in *C. subparallelus*; 2,6 mm in *C. alpestris*;
- per il pene, vedasi figg. 1 e 2.

Ringraziamo il Dr. P. Basilewsky, Direttore del Museo di Tervuren, e la Sig.na H. Perrin del Museo di Parigi per averci inviato il prezioso materiale di confronto.

ABSTRACT

Canthyporus kenyensis n. sp., from Mount Kenya (Coleoptera Dytiscidae).

The new species, collected in the water of a little spring about 3.100 m high, is related to *C. subparallelus* GUIGNOT and to *C. alpestris* GUIGNOT, with which is compared.

Indirizzo degli AA.: A. Bilardo, Via De Amicis 29, 21012 Cassano-Magnago (Varese); N. Sanfilippo, Via D. Chiodo 9 C/7, 16136 Genova.